BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL

CORSE

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL ÉCOPHYTO

ARBORICULTURE n°6 – 3 avril 2025

CHAMBRES D'AGRICULTURE CORSE

SOMMAIRE

Abricotier
Pêcher
Prunier
Prévision météo

ANIMATEUR FILIERE : CRA Corse
Rédacteur : Isabelle MILLELIRI

CHAMBRES D'AGRICULTURE CORSE

Structures partenaires : CANICO, exploitants observateurs

Directeur de publication : Jean Baptiste ARENA Président de la Chambre d'Agriculture de région Corse
Route du stade
Lieu dit Petraolo
20215 VESCOVATO
Tel : 04 95 32 84 40
Fax : 04 95 32 84 43
http://www.cra-corse.fr/
Crédit photo : CRA Corse

ÉCOPHYTO RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO.

A retenir

Pêcher :

Tordeuse : la confusion doit être posée
Cloque : toujours des dégâts observés sur les nouvelles pousses
Thrips : augmentation de la pression cette semaine
Pucerons : présence de foyers sur les 2 bassins

Abricotier, prunier :

Moniliose : risque en cours

Rappel protection des pollinisateurs - Arrêté du 20 nov 2021

Tout traitement insecticide est interdit pendant la période de butinage ; la plage horaire est accordée pour certains insecticides, disposant de la mention abeille. Les applications sont autorisées en fin de journée 2 h avant le coucher du soleil et 3 h après le coucher du soleil. Ces règles sont également applicables pendant toute la saison : l'enherbement dans les rangs doit être tondu avant l'application de produits insecticides.

Note nationale Abeilles - Pollinisateurs

ABRICOTIER

- **Stades phénologiques**

Stade petit fruit (Soledane, Koolgat)
Stade chute des colerettes (Lady Cot)
Les floraisons sont hétérogènes : on peut constater un étalement des stades phénologiques sur une même variété.

Stade petit fruits (koolgat)



Stade chute colerettes (Lady cot)

- **Moniliose sur fleur et rameaux – *Monilia laxa***

Observation : aucun symptôme n'est observé à ce jour.
Evaluation du risque : la période de sensibilité est en cours pour les variétés ayant atteint le stade floraison. Les conditions climatiques annoncées sont favorables aux contaminations. Le risque est élevé.

- **Oïdium**

Biologie : cf pêcher
Observation : Le stade de sensibilité débute pour les variétés les plus précoces. Aucun symptôme n'est observé à ce jour.
Evaluation du risque : La période de risque de contamination débute. Le risque est moyen à élevé sur les variétés sensibles.

Gestion du risque : des stratégies à base de produits de biocontrôle peuvent mises en œuvre pour gérer les risques de contaminations. Liste des produits de biocontrôle

- **Tordeuse orientale du pêcher – *Grapholita molesta***

Cf pêcher

- **Maladie de la criblure – *Coryneum beijerinckii***

Ce champignon hiverne sous forme de mycélium dans le bois et les bourgeons de ses plantes hôtes. Les vents et les pluies du printemps véhiculent les spores formées dans ces organes végétatifs et les propagent sur les jeunes feuilles. Les symptômes se manifestent par l'apparition de taches rondes, de couleur brune (abricotier), avec parfois une bordure rouge ; le tissu foliaire dans les zones nécrosées se détache plus tard du parenchyme, laissant apparaître de petits trous. Le feuillage inférieur, qui pousse dans les parties basales de l'arbre, est le premier à être contaminer et à subir les dégâts.
Observation : le stade de sensibilité est en cours.
Evaluation du risque : les conditions climatiques annoncées sont favorables aux contaminations. Le risque est élevé.

PECHER

- **Stade phénologique**

Stade petit fruit pour les variétés à débourrement très précoce (Early bomba, Princess Time, Pampana, Boréal…) ;
Stade chute des collerettes pour la majorité des variétés
Stade chute des pétales (Sweet Star)

Chute des collerettes / petit fruit

- **Tordeuse orientale du pêcher – *Cydia molesta***

Observation : un réseau de piège a été installé sur des parcelles confusées et non confusées. Les captures sont toujours notées en augmentation sur une parcelle témoin non confusée. Par contre, aucune capture sur les parcelles confusées n'est constatée
La modélisation indique que la viabilité des pontes était atteinte au 30 mars pour le secteur de Casinca et 26 mars sur le bassin de san Giuliano.
Evaluation du risque : le vol est en cours, le risque augmente.



Gestion du risque : la mise en place de la confusion sexuelle doit être installée au plus vite si cela n'est pas encore effectué. Cette technique alternative est indispensable pour une lutte efficace du papillon. Liste des produits de biocontrôle

- **Cloque - *Taphrina deformans***

Observation : Des symptômes sont visibles sur de nouvelles variétés sur les 2 bassins de production. Les épisodes pluvieux successifs depuis le débourrement ont été contaminants. Les conditions climatiques restent favorables aux contaminations.
Evaluation du risque : Le stade de sensibilité se termine. Une vigilance est toutefois nécessaire sur les parcelles et variétés touchées.



Gestion du risque : les produits de biocontrôle peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte. Liste des produits de biocontrôle
Eliminer les bouquets contaminés des arbres et les sortir de la parcelle et les brûler.

- **Thrips – *Thrips meridionalis***

Observation : Les battages ou observations des corolles effectués ce début de semaine indiquent une augmentation de la pression de thrips.
Selon les variétés, on peut parfois observés des dégâts sur petit fruit, malgré une pression faible depuis le début de la floraison.
Des thrips méridionalis et californien ont été observés sur les 2 secteurs.
Les conditions climatiques à venir sont favorables à leur recrudescence sur les variétés sensibles étant toujours au stade chute collerettes.
Evaluation du risque : La période de sensibilité se poursuit jusqu'à la fin de la chute des collerettes. Le risque est élevé.

Gestion du risque : l'utilisation de barrière physique peut limiter les populations de thrips. Liste des produits de biocontrôle

- **Oïdium - *Podosphaera pannosa***

L'oïdium se caractérise par des amas farineux à la face inférieure des feuilles, par des rameaux déformés et chétifs pouvant aller jusqu'à une chute des feuilles prématurée. Des taches circulaires blanchâtres puis foncées apparaissent sur les fruits à partir du mois de mai. Son développement est lié à une sensibilité variétale, ainsi qu'aux conditions climatiques : les contaminations sont déclenchées à partir d'une hygrométrie supérieure à 50 % mais les conidies ne germent pas en milieu liquide. Le développement est favorisé par l'alternance de temps sec et venteux puis humide.
Observation : le stade de sensibilité débute pour les variétés les plus précoces. Aucun symptôme n'est observé à ce jour.
Evaluation du risque : les conditions climatiques annoncées sont favorables aux contaminations. Le risque est élevé.

Gestion du risque : l'utilisation de produits de biocontrôle (soufre) peut être intégrée dans les stratégies de lutte. Liste des produits de biocontrôle

- **Puceron vert – *Myzus persicae***

Observation : De nouveaux foyers de pucerons ont été constatés sur les 2 bassins de production ; ceux-ci sont surtout observés sur les variétés les plus précoces.
A ce jour, aucun auxiliaire (syrphe, coccinelle, chrysope) n'a été observé sur les foyers.
Evaluation du risque : La période de sensibilité est en cours. Le risque est élevé.

PRUNIER

- **Stade phénologique**

Stade chute des collerettes : Fortune, Catalina
Stade fin de chute des pétales : Golden Japan
Stade Floraison TC Sun, Reine Claude

Stade fin chute des pétales (Fortune)

Stade floraison (Ruby Queen)

- **Puceron**

Cf Pêcher

- **Moniliose sur fleurs et rameaux – *Monilia laxa***

Cf abricotier

- **Maladie de la criblure – *Coryneum beijerinckii***

Observation : le stade de sensibilité est en cours.
Evaluation du risque : les conditions climatiques annoncées sont favorables aux contaminations. Le risque est élevé.

PREVISION METEO

	Vendredi 4 avril	Samedi 5 avril	Dimanche 6 avril	Lundi 7 avril	Mardi 8 avril	Mercredi 9 avril	Jeudi 10 avril	Vendredi 11 avril
Haute Corse/ Corse du Sud								
	Beau temps		Temps mitigé	Retour d'un temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux mardi pouvant donner des averses en soirée		Temps ensoleillé		Beau temps

LIENS UTILES

Consulter les notes sur le site EcophytoPic [Les notes communes / nationales | Ecophytopic] ou en cliquant sur les images ci-dessous :

Résistance

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'actions différents.

Le **réseau R4P** réalisé conjointement par l'INRAE et l'ANSES tient à jour une liste des problèmes de résistances aux produits phytosanitaires. https://www.r4p-inra.fr/fr/home/

Produits de biocontrôle

Ces produits phytopharmaceutiques sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

- les macro-organismes ;
- les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones et les kairomones, ou de substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale.

Leur spécificité est liée à leur caractère naturel ou leur mode d'action reposant sur des mécanismes naturels. Ils constituent des outils de prédilection pour la protection intégrée des cultures.

Cette liste est périodiquement mise à jour. Liste des produits de biocontrôle

Accédez à la rubrique ECOPHYTO du site internet de la Chambre d'Agriculture de Corse (cliquez sur la vignette)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès des techniciens.