



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL CORSE



VITICULTURE

N°7 – 24 juillet 2025

A RETENIR

Mildiou : Nouveaux symptômes en cours malgré une météo clémente

Oïdium : Situation assainie

Flavescence dorée : 3^{ème} traitement obligatoire avant le 27 juillet

Pyrale des agrumes : Vol en cours + quelques foyers - période clé dans la surveillance

Cicadelles vertes : Populations en augmentation + début de symptômes – A surveiller !

• STADES PHENOLOGIQUES

Tous les cépages ont entamé leur véraison. En côte orientale, les plus avancés sont la Syrah, le Biancu Gentile, le Niellucciu (20 à 100% vérés selon la précocité des secteurs). Le Grenache et le Sciaccarellu en sont en moyenne à 20%, et le Vermentinu se situe entre début et mi-véraison.

En terme de précocité, ce millésime est globalement semblable au précédent.



Stade M : début - mi véraison - 80% véraison

• FLAVESCENCE DOREE

La réglementation a évolué (cf. [arrêté du 27 avril 2021](#)). A partir de 2022, elle s'est traduite par de nouvelles règles de surveillance et de lutte, impliquant la responsabilité des professionnels, et introduit la notion de « zone délimitée », qui regroupe une zone infestée et une zone tampon d'un rayon minimal de 500 mètres. Les autres zones sont considérées « exemptes ».

Arrêté préfectoral et zones délimitées (2025) : cliquer sur [ce lien](#).

Dates de traitement : Le communiqué précisant le nombre et les [dates de traitements obligatoires](#) contre *Scaphoideus titanus* pour 2025 se trouve sur le site de la DRAAF.

En cas de suspicion, prévenir la DDETSP (Haute-Corse : 0495585050 - Corse du sud : 0495503940) ou la FREDON (04 95 26 68 81), organisme délégué par la DRAAF pour l'épidémiosurveillance des Organismes Nuisibles Réglementés des végétaux

SOMMAIRE

Stades phénologiques

Flavescence dorée

Mildiou

Oïdium

Pyrale des agrumes

Tordeuses de la grappe

Cicadelles vertes

Prévision météo

Liens utiles

ANIMATEUR FILIERE : CRVI

Rédacteur : Gilles Salva,
Lilou Berloquin



Centre de Recherche
Viticole de Corse
CENTRU DI RICERCA
VITICOLA DI CORSICA

Structures partenaires :

CRA Corse, Cave d'Aleria,
CANICO, CAP, Christophe
George, Inter Bio Corse,
Viti-oenconseil

Directeur de publication :

Jean Baptiste ARENA
Président de la Chambre
d'Agriculture de région
Corse

Route du stade

20215 VESCOVATO

Tel : 04 95 32 84 40

Fax : 04 95 32 84 43

<http://www.cra-corse.fr/>

Crédit photo : CRVI de Corse,
CDA 2B, Cave d'Aleria



Action pilotée par le
Ministère chargé de
l'agriculture, avec l'appui
financier de l'Office Français
de la Biodiversité par les
crédits issus de la redevance
pour pollutions diffuses
attribués au financement du
plan ÉCOPHYTO.

• MILDIOU


Biologie : cf BSV antérieurs

Observations : De nouveaux symptômes de faible intensité ont été observés en début de semaine sur feuilles de Niellucciu, à Patrimonio et sur la côte orientale. Le champignon est toujours actif sur les parcelles fortement touchées, et la forme mosaïque continue de s'étendre. Les grappes sont saines en tous secteurs.

Evaluation du risque : Les pluies des 5 et 13 juillet ont amené de l'humidité favorable au développement du champignon, il faut donc rester vigilant dans les secteurs sensibles (voir carte ci-contre). Pour le reste de la Corse, le risque est très faible et l'EPI diminue toujours. Enfin, les grappes ont dépassé le stade de sensibilité, le risque de contamination est donc faible.



Aucun Faible Moyen Fort Très fort



Carte du niveau de risque
Mildiou sur la Corse




Mildiou : « Tache d'huile » face supérieure



Mildiou : forme mosaïque



Mildiou sur grappe : « rot brun »



Gestion du risque :

Techniques alternatives :

B Il existe des produits de biocontrôle dont la liste est consultable [ICI](#) (compilation IFV 2024 pour la vigne).

Méthodes prophylactiques

- Epamprage : suppression des organes verts à proximité du sol.
- Enherbement maîtrisé ou travail du sol : diminution des foyers primaires (plantules) ainsi que des remontées humides dans les ceps.
- Gestion de la végétation (ébourgeonnage, palissage, effeuillage...) : limitation de l'entassement et par conséquent réduction de l'humidité potentielle.

R **Résistances :** Une note nationale fait le point sur les résistances du champignon vis-vis de certains produits phytosanitaires, et décrit les recommandations à respecter afin d'adapter son calendrier de traitement

Consultez la note nationale en cliquant [ICI](#) ;

Plus d'infos sur l'état des lieux des résistances : <https://www.r4p-inra.fr>

• OÏDIUM

Biologie : cf BSV antérieurs

Observations : Peu de nouvelles attaques sont signalées. Dans les vignes où il est présent, le champignon semble ralentir son expansion et sèche. A Patrimonio, quelques baies de Muscat sont touchées, en côte orientale, certains Niellucciu et Carcaghjolu présentent des symptômes sans gravité.



Oïdium sur baies :
Poussière grise d'aspect cendré - Eclatement de baies

Évaluation du risque : Si le champignon s'est manifesté avant fermeture de la grappe, il peut quand-même continuer sa progression jusqu'à provoquer l'éclatement des baies, entraînant par la suite l'apparition de pourriture grise ou acide.

Le risque est maintenant en baisse, y compris, au vu des observations, dans les parcelles atteintes avant fermeture.



Aucun Faible Moyen Fort Très fort

Gestion du risque :

Techniques alternatives :

B Il existe des produits de biocontrôle dont la liste est consultable [ICI](#) (compilation IFV 2024 pour la vigne).

Méthodes prophylactiques

Bien soigner l'ébourgeonnage, l'effeuillage et le palissage afin de favoriser l'aération du feuillage et des grappes.

R **Résistances :** Une note nationale fait le point sur les résistances du champignon vis-vis de certains produits phytosanitaires, et décrit les recommandations à respecter afin d'adapter son calendrier de traitement

Consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

Plus d'infos sur l'état des lieux des résistances : <https://www.r4p-inra.fr>

• PYRALE DES AGRUMES

Biologie : *Cryptoblabes gnidiella*, nommée pyrale du Daphné ou pyrale des agrumes, se nourrit du miellat sécrété par les cochenilles et/ou de raisins ayant atteint la maturité. 4 à 5 générations se succèdent au cours de la saison. Les premières larves apparaissent fin mai/début juin. La larve mature peut se nourrir des baies vertes. Ce lépidoptère est fortement nuisible puisqu'il cause des pertes de récolte importantes et peut engendrer des attaques de pourriture grise.

On peut facilement observer les larves sur les cépages dont les grappes ont déjà atteint le stade fermeture (Niellucciu, Grenache, Muscat à petit grain...), particulièrement sur vigne à forte vigueur, avec des grappes enchevêtrées.

D'importants dégâts se sont produits en 2018, ainsi que les années suivantes selon les secteurs, au stade maturité des raisins. Certaines vendanges ont dû être précipitées lors de fortes attaques.

Observations : On assiste à une recrudescence des captures ces dernières semaines.

- 50 à 80 au maximum sur la côte orientale
- 20 à 30 en moyenne dans le secteur de Patrimoine.

Peu de nouvelles larves ont été repérées si ce n'est sur Grenache en Balagne et sur la côte orientale. Dans ces situations les attaques, accompagnées de présence de cochenilles (et fumagine) sont cependant de faible ampleur.

Evaluation du risque : Le stade fermeture est un stade clé : une fois à l'intérieur des grappes il est souvent difficile de combattre ce ravageur. Et c'est à l'approche de la véraison et surtout de la maturité que les dégâts sont les plus visibles et importants.

Le risque est faible en général actuellement, mais fort sur les parcelles à historique et où les larves sont déjà présentes.



Aucun Faible Moyen Fort Très fort

Gestion du risque : Poursuivre la surveillance des vols, limiter les populations de cochenilles. En hiver, il sera nécessaire de supprimer les grappes fortement endommagées (« momifiées ») pour réduire le stock d'individus.

• TORDEUSES DE LA GRAPPE

Biologie : cf BSV antérieurs


Observations : Peu ou pas de captures et perforations signalées.

Evaluation du risque : D'après la modélisation, la troisième génération est en cours. Les dates clés de celle-ci sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Au vu des retours d'observations, le risque est faible en général.



Aucun Faible Moyen Fort Très fort



Larve de *Cryptoblabes* sur baie

Photo AG.Dubreuil-Lachaud (CRA Corse)

Photo AG.D. Dubreuil-Lachaud (CRA Corse)

Stations	Début de vol 3ème G	Début des pontes	Début des éclosions	Situation actuelle
Ajaccio	02/07/2025	12/07/2025	17/07/2025	Début larves âgées
Aléria	06/07/2025	12/07/2025	19/07/2025	Début larves âgées
Calvi	05/07/2025	13/07/2025	19/07/2025	Début larves âgées
Patrimonio	06/07/2025	14/07/2025	20/07/2025	Début larves âgées
Sartène	01/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	Début larves âgées

Dates clés de la troisième génération d'Eudémis (Modèle EVA Eudémis- Epicure)

Gestion du risque : Il existe des produits de biocontrôle dont la liste est consultable [ICI](#) (compilation IFV 2024 pour la vigne).



La confusion sexuelle est une méthode qui a pour but de diffuser de façon massive des phéromones de synthèse (mimant la substance naturelle émise par la femelle pour attirer le mâle). Cette saturation de l'atmosphère rend les mâles incapables de localiser les femelles permettant la diminution des accouplements. Pour optimiser l'efficacité de la confusion, la zone protégée doit être importante : 10 ha minimum d'un seul tenant.

Il est encore temps de mettre en place cette méthode dans le vignoble.

- **CICADELLES VERTES - *Empoasca vitis* et *Jacobiasca lybica***

Biologie : cf BSV antérieurs

Observations : Concernant les populations d'adultes, les captures sur plaques engluées restent stables, même si leur nombre est toujours élevé (350 cicadelles par semaine en moyenne depuis la fin du mois de juin). Les populations larvaires sont actuellement en augmentation, de l'ordre de 10 à 50 larves pour 100 feuilles en général, hormis à Patrimonio où on dénombre jusqu'à 100 larves pour 100 feuilles. Des symptômes commencent à apparaître, surtout sur Vermentinu à Patrimonio, sur la façade orientale et à Ajaccio. On les observe sous la forme d'apex jaunissant, avec feuilles recourbées et parfois d'entre-nœuds courts sur rameaux secondaires surtout mais aussi sur rameaux primaires.



Larve de cicadelle verte face inférieure



Symptôme de grillure
Photo I. Dubusse (Cave d'Aleria)



Symptôme sur feuille au niveau des
rameaux secondaires

Evaluation du risque : le risque est en augmentation, et fort actuellement en tous secteurs.

Il est primordial, à cette époque, d'effectuer régulièrement des comptages larvaires pour évaluer les niveaux de populations



Aucun Faible Moyen Fort Très fort



Gestion du risque :

Techniques alternatives :

Il existe des produits de biocontrôle dont la liste est consultable [ICI](#) (compilation IFV 2024 pour la vigne).

PREVISION METEO (Source Météo France)

	Vendredi 25 juillet	Samedi 26 juillet	Dimanche 27 juillet	Lundi 28 juillet	Mardi 29 juillet	Mercredi 30 juillet	Jeudi 31 juillet	Vendredi 1 ^{er} août
Haute - Corse / Corse du Sud								
	Temps orageux cette fin de semaine ; temps nuageux ce vendredi après-midi	Temps ensoleillé dans l'ensemble	Risque d'orages sur le relief et la côte Est	Temps ensoleillé sur le littoral excepté le Sud Est avec risque d'averses orageuses sur le relief	Temps ensoleillé sur le littoral excepté le Sud Est avec risque d'averses orageuses sur le relief	Temps ensoleillé sur le littoral avec risque d'averses orageuses sur le relief		

LIENS UTILES



Note nationale pollinisateurs - Rappel protection des pollinisateurs - Arrêté du 20 nov 2021

Tout traitement insecticide est interdit pendant la période de butinage ; la plage horaire est accordée pour certains insecticides, disposant de la mention abeille. Les applications sont autorisées en fin de journée 2 h avant le coucher du soleil et 3 h après le coucher du soleil. Ces règles sont également applicables pendant toute la saison : l'enherbement dans les rangs doit être tondu avant l'application de produits insecticides.

[Note nationale Abeilles - Pollinisateurs](#)

Résistance



Des résistances aux produits phytosanitaires existent. De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'actions différents.

Le **réseau R4P** réalisé conjointement par l'INRAE et l'ANSES tient à jour une liste des problèmes de résistances aux produits phytosanitaires. <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

Produits de biocontrôle



Les produits phytopharmaceutiques sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

- les macro-organismes ;
- et les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones et les kairomones, ou de substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale.

Leur spécificité est liée à leur caractère naturel ou leur mode d'action reposant sur des mécanismes naturels. Ils constituent des outils de prédilection pour la protection intégrée des cultures.

Cette liste est périodiquement mise à jour.

<https://corse.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto>

Notes nationales Biodiversité Consulter les notes sur le site EcophytoPic [Les notes communes / nationales | Ecophytopic](#) ou en cliquant sur les images ci-dessous :



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès des techniciens.