



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL CORSE



VITICULTURE N°8 – 29 juillet 2026

SOMMAIRE

Stades phénologiques
Mildiou
Oïdium
Tordeuses de la grappe
Pyrale des agrumes
Cicadelles vertes
Autres
Prévision météo
Liens utiles

ANIMATEUR FILIERE : CRVI
Rédacteur : Gilles Salva



Structures partenaires :
CA Corse, Cave d'Aléria,
CANICO, CAP, Terra Vecchia,
Inter Bio Corse, Christophe
George.
Crédit photo : CRVI de Corse,
CA 20, Canico, Inter Bio Corse

Directeur de publication :
Jean Baptiste ARENA
Président de la Chambre
d'Agriculture de région
Corse
Route du stade
20215 VESCOVATO
Tel : 04 95 32 84 40
Fax : 04 95 32 84 43
<http://www.cra-corse.fr/>

Action de la stratégie
Ecophyto 2030 pilotée par
les ministères chargés de
l'Agriculture, de
l'Environnement, de la Santé
et de la Recherche avec le
soutien financier de l'Office
Français de la Biodiversité.



A RETENIR

Stades phénologiques : la véraison touche à sa fin, les contrôles maturité ont commencé.
Mildiou : le développement du champignon est stoppé, attention tout de même aux secteurs à risque.
Oïdium : pas d'évolution particulière.
Cicadelle : augmentation des populations, apparition des grillures selon les secteurs.

STADES PHENOLOGIQUES

L'ensemble des cépages, tout secteur confondu, a désormais atteint le stade mi-véraison. Pour les cépages précoces ce stade est déjà terminé et la maturation continue. Une avance de quelques jours est observée par rapport au millésime 2025.



Stade mi véraison
(Stade M ou 83)



80% véraison
(Stade M ou 84)

MILDIOU

Biologie : cf. bulletin n°3

Observations : Dans l'ensemble, aucun nouveau symptôme de mildiou n'est observé sur l'île. Seules les parcelles situées dans des zones humides et présentant une croissance végétative active peuvent ponctuellement exprimer quelques symptômes uniquement sur feuillage (parfois sous forme mosaïque). Aucun symptôme n'a été observé sur grappes à ce jour.

Evaluation du risque : Les pluies enregistrées localement en Balagne et dans le secteur d'Ajaccio ont pu créer des conditions favorables à de nouvelles contaminations sur le feuillage. Cependant, comme la majorité des vignobles est désormais au stade mi-véraison, la sensibilité des grappes est fortement réduite. Une vigilance reste toutefois nécessaire sur les parcelles les plus tardives ou présentant des foyers actifs.

Si des contaminations ont eu lieu lors de cet épisode pluvieux, les symptômes ne seront visibles que dans une dizaine de jours. Le risque est faible sur les autres secteurs, et moyen sur les parcelles humides et ayant déjà présenté des foyers actifs.



Aucun Faible Moyen Fort Très fort

Gestion du risque :

Techniques alternatives :

Il existe des produits de biocontrôle dont la liste est consultable [ICI](#) (compilation IFV 2025).

Méthodes prophylactiques

- Epamprage : suppression des organes verts à proximité du sol.
- Enherbement maîtrisé ou travail du sol : diminution des foyers primaires (plantules) ainsi que des remontées humides dans les ceps.
- Gestion de la végétation (ébourgeonnage, palissage, effeuillage...) : limitation de l'entassement et par conséquent réduction de l'humidité potentielle.

Résistances : Une note nationale fait le point sur les résistances du champignon vis-à-vis de certains produits phytosanitaires, et décrit les recommandations à respecter afin d'adapter son calendrier de traitement.

Consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

Plus d'infos sur l'état des lieux des résistances : <https://www.r4p-inra.fr>

OÏDIUM

Biologie : cf. bulletin n°3

Observations : Aucun nouveau symptôme n'a été observé depuis ces derniers jours sur les parcelles de référence.

Le champignon ne semble plus progresser, sauf éventuellement dans les parcelles déjà touchées.



Face supérieure : Taches huileuses avec gaufmage du limbe



Grappes : aspect poudreux et couleur grisâtre

Évaluation du risque : La vigne ayant dépassé le stade de fermeture de la grappe, sa sensibilité à l'oidium diminue.

Les conditions climatiques récentes ne devraient donc pas entraîner de reprise significative des contaminations.

Les symptômes continuent d'évoluer principalement sur les grappes déjà atteintes, tandis que le risque de nouvelles attaques sur grappes devient faible à ce stade phénologique.



Aucun Faible Moyen Fort Très fort

Gestion du risque :

Techniques alternatives :

Il existe des produits de biocontrôle dont la liste est consultable [ICI](#) (compilation IFV pour la vigne).

Méthodes prophylactiques

Bien soigner l'ébourgeonnage, l'effeuillage et le palissage afin de favoriser l'aération du feuillage et des grappes.

Résistances : Une note nationale fait le point sur les résistances du champignon vis-vis de certains produits phytosanitaires, et décrit les recommandations à respecter afin d'adapter son calendrier de traitement. Consultez la note nationale en cliquant [ICI](#).

Plus d'infos sur l'état des lieux des résistances [ICI](#).

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Biologie : cf. bulletin n°3

Observations : Des œufs sont localement observés sur grappes de Vermentinu en Côte Orientale.

Pour le nord de l'île, aucun signalement particulier.

Dans le Sud, quelques vers ont été observés dans le secteur d'Ajaccio.



Evaluation du risque : Le risque reste faible, sauf sur les parcelles à historique, qui sont susceptibles de subir des dégâts sur grappes en raison de la présence potentielle d'insectes.

Selon la modélisation, les vols G3 se terminent, avec quelques hétérogénéités selon les secteurs :

- Aléria : les vols G3 sont terminés, présence de larves L3 en majorité
- Patrimonio et Calvi : les vols G3 devraient se terminer d'ici quelques jours, présence de L1/L2
- Ajaccio et Sartène : les vols G3 se terminent avec une présence de larves L1/L2 seulement



Tordeuses : pontes sur grappe de Vermentinu



Gestion du risque : Il existe des produits de biocontrôle dont la liste est consultable [ICI](#) (compilation IFV 2025).

B **La confusion sexuelle** est une méthode qui a pour but de diffuser de façon massive des phéromones de synthèse (mimant la substance naturelle émise par la femelle pour attirer le mâle). Cette saturation de l'atmosphère rend les mâles incapables de localiser les femelles permettant la diminution des accouplements. Pour optimiser l'efficacité de la confusion, la zone protégée doit être importante : 10 ha minimum d'un seul tenant. Il est encore temps de mettre en place cette méthode dans le vignoble.


PYRALE DES AGRUMES - CRYPTOBLABES GNIDIELLA

Biologie : cf. bulletin n°7

Observations : Les populations sont encore présentes à Patrimonio et en Côte Orientale mais ne semblent pas augmenter.

Aucun individu n'a été signalé dans le reste de l'île.

Evaluation du risque : A l'approche de la véraison, et surtout de la maturité, les dégâts peuvent devenir importants. Le risque est faible en général, mais fort sur les parcelles à historique et où les larves sont déjà présentes.



Larve de Cryptoblabes sur baie

Source : CA20

CICADELLES VERTES

Biologie : cf. bulletin n°3

Observations : Les populations de cicadelles restent globalement en augmentation sur l'ensemble du vignoble, avec toutefois une forte hétérogénéité selon les secteurs et les parcelles.

En côte orientale, les captures atteignent en moyenne 600 adultes par semaine. Des grillures sont désormais observées sur les parcelles présentant les plus fortes populations. Le nombre de larves poursuit une progression lente, avec une moyenne de 13 larves pour 100 feuilles observées chaque semaine.

Dans le nord, les populations montrent une nette augmentation depuis une semaine ; un pic de 800 adultes a notamment été enregistré sur une parcelle où les premières décolorations ont été observées (Vermentinu).

Dans le secteur d'Ajaccio, les niveaux restent plus modérés, avec en moyenne 285 adultes capturés et 6 larves pour 100 feuilles.

Plus largement dans le sud de l'île, la présence de cicadelles est très variable d'un secteur à l'autre, sans situation particulièrement préoccupante à ce stade.

Evaluation du risque : À l'approche des vendanges, la vigilance doit être renforcée car des blocages de maturité ont été observés par le passé sur des parcelles fortement touchées par la cicadelle.

Le niveau de risque est désormais en augmentation sur l'ensemble du vignoble : il est considéré comme fort en côte orientale et moyen dans les autres secteurs. Il est donc important de maintenir des relevés hebdomadaires afin de suivre l'évolution des populations adultes et larvaires.

Entre août et septembre, une augmentation rapide des effectifs peut être observée, souvent suivie d'une progression marquée des symptômes, ce qui nécessite une vigilance renforcée au cours des prochaines semaines.



Aucun Faible Moyen Fort Très fort



Décoloration sur Vermentinu (22.07)



Grillures sur Sciaccarellu (21.07)



Grillures sur Vermentinu (28.07)

AUTRES



- **Echaudage** : dégâts importants sur l'ensemble du vignoble de Figari impactant les rendements.
- **Millerandage** : quelques baies millerandées sur Sciaccarellu.
- **Animaux** : quelques dégâts sur grappes causés par les oiseaux et les sangliers.
- **Cochenilles** : beaucoup d'individus recensés en Côte Orientale qui engendrent des dégâts importants sur certaines parcelles.

Miellat de Cochenilles (pouvant engendrer de la pourriture acide)

PREVISION METEO

	Jeudi 30 juillet	Vendredi 31 juillet	Samedi 1 ^{er} août	Dimanche 2 août	Lundi 3 août	Mardi 4 août	Mercredi 5 août	Jeudi 6 août
Haute Corse/ Corse du Sud								
	Temps ensoleillé ; élévation des températures		Maintien d'un temps ensoleillé ; dégradation orageuse sur le relief pouvant déborder sur le secteur de la plaine orientale		Temps instable avec possibilité d'averses sur le relief et le Sud de la plaine orientale		Temps instable avec possibilité d'averses sur le relief et la plaine orientale	

LIENS UTILES

Note nationale pollinisateurs - Rappel protection des pollinisateurs - Arrêté du 20 nov 2021

Tout traitement insecticide est interdit pendant la période de butinage ; la plage horaire est accordée pour certains insecticides, disposant de la mention abeille. Les applications sont autorisées en fin de journée 2 h avant le coucher du soleil et 3 h après le coucher du soleil. Ces règles sont également applicables pendant toute la saison : l'enherbement dans les rangs doit être tondu avant l'application de produits insecticides.

[Note nationale Abeilles - Pollinisateurs](#)

Résistance



Des résistances aux produits phytosanitaires existent. De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'actions différents.

Le **réseau R4P** réalisé conjointement par l'INRAE et l'ANSES tient à jour une liste des problèmes de résistances aux produits phytosanitaires

<https://www.r4p-inra.fr>

Produits de biocontrôle



Ces produits phytopharmaceutiques sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

- Les macro-organismes ;
- Les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones et les kairomones, ou de substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale.

Leur spécificité est liée à leur caractère naturel ou leur mode d'action reposant sur des mécanismes naturels. Ils constituent des outils de prédilection pour la protection intégrée des cultures. Cette liste est périodiquement mise à jour. [Liste des produits de biocontrôle](#)

Notes nationales Biodiversité

Consulter les notes sur le site EcophytoPic [Les notes communes / nationales | Ecophytopic](#) ou en cliquant sur les images ci-dessous :



Les 3 nouvelles notes nationales Biodiversité qui viennent d'être publiées.



Vigilance lors de l'introduction de matériel végétal

L'introduction de végétaux, qu'il s'agisse d'arbres fruitiers, forestiers, d'arbres ou d'arbustes champêtres, nécessite une vigilance importante.

De nombreux organismes nuisibles sont présents dans le bassin méditerranéen, notamment le virus CYVCV ([Citrus Yellow Vein Clearing Virus](#)) affectant les agrumes, la bactérie [Xylella fastidiosa](#), ainsi que des ravageurs tels que [Trioza erytreae](#) et [Aleurocanthus spiniferus](#).

La prévention demeure le moyen le plus efficace pour protéger durablement les productions végétales. En effet, certains de ces organismes peuvent entraîner des conséquences particulièrement graves pour les cultures. En l'absence de solutions curatives réellement efficaces, l'arrachage des végétaux contaminés constitue souvent la seule mesure permettant de limiter leur propagation une fois qu'ils sont introduits sur le territoire.

Il est donc essentiel de s'approvisionner auprès de filières et de pépiniéristes offrant toutes les garanties sanitaires requises. Il convient également de vérifier l'origine des végétaux introduits et de signaler sans délai toute anomalie sanitaire observée.

La vigilance de chacun est indispensable pour préserver durablement la santé des productions végétales et limiter les risques d'introduction et de diffusion de ces organismes nuisibles sur notre territoire

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès des techniciens.