


Bulletin de situation N°2 – Bombyx disparate

23 juin 2025



Situation :

L'infestation exceptionnelle tant par l'ampleur des surfaces impactées que par les cycles de reproduction plus rapides que dans les épisodes précédents, par la chenille du Bombyx Disparate qui touche la Corse depuis quelques semaines se poursuit.

Les analyses du département de la santé des forêts du ministère en charge de l'Agriculture et de ses correspondants locaux permettent, comme annoncé, de confirmer que le pic est atteint et que la décroissance s'amorce avec début de refeuillaison de certains territoires (cf cartographies ci-après).

Si la chenille de Bombyx Disparate s'observe surtout sur les chênes et les châtaigniers, relevons qu'elle est particulièrement polyphage et peut se nourrir d'autres plantes (hêtre, et certains arbres fruitiers, notamment). Les expertises devront donc porter à la fois sur le volume des surfaces mais potentiellement aussi sur la nature des surfaces touchées.

Évaluation et évolution des surfaces :

Les experts du département de la santé des forêts estiment que les chenilles ont atteint depuis quelques jours leur taille maximale, leurs déplacements sont donc limités : c'est surtout au début du cycle que l'insecte, de petite taille, se déplace significativement.

La phase de décroissance semble amorcée et une refeuillaison des chênes est d'ores et déjà observable par endroits.

Ces éléments sont confirmés par les analyses en cours sur les 5 foyers, où nous constatons :

- une diminution des surfaces impactées sur les foyers du Cap Corse et du Nord de Bastia, liée à la refeuillaison ;
- une expansion limitée des surfaces impactées sur les foyers du Centre Corse et dans les vallées du Prunelli et du Taravo.



En revanche, le foyer est toujours en cours dans le secteur de Ventiseri.

Sur les 5 foyers suivis, seul celui de Ventiseri serait toujours encore en cours , pour les autres, ils seraient en phase de stagnation sur les vallées du Prunelli et du Taravo, et dans le Centre Corse, les deux plus gros foyers de la région, et de décroissance sur Bastia et Cap Corse.

Les surfaces actuellement impactée par la chenille du Bombyx Disparata s'étendent sur environ 20 000 hectares.


Vous trouverez joint à ce bulletin, un état de la situation sur les 5 foyers repérés en Corse : Cap Corse, Nord de Bastia, Centre Corse, vallées du Prunelli et du Taravo, et Ventiseri.

ZONE "BASTIA"
Sévérité des infestations du bombyx disparate
au 19-06-2025



Évolution de la surface infestée
 depuis le 13-06-2025: -11.1%



Carte situation du 13-06-2025



Depuis, les dernières analyses des images satellites remontant au 13/06, on note une décroissance de la surface infestée d'environ - 11 %, au 19/06. La refeuccailaison est en cours et la décroissance amorcée.


(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)

ZONE "CAP CORSE"
Sévérité des infestations du bombyx disparate
au 19-06-2025



Évolution de la surface infestée
 depuis le 13-06-2025: -2.4%

Carte situation du 13-06-2025




Depuis, les dernières analyses des images satellites remontant au 13/06, on note une décroissance de la surface infestée d'environ – 2 %, au 19/06. La refeuillaison est en cours et la décroissance amorcée.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)

ZONE CENTRE CORSE **Sévérité des infestations du bombyx disparate** **au 19-06-2025**

Évolution de la surface infestée
 depuis le 13-06-2025: 21.5%

Carte situation du 13-06-2025



Alors que sur la période du 13/06, des progressions en surfaces de + 63 % étaient observées, les dernières images satellites démontrent un ralentissement de l'expansion autour de 21 % sur la dernière semaine. Des refeuillaisons sont d'ores et déjà observées sur le secteur et la décroissance semble amorcée.


(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)

ZONE VALLÉES DU PRUNELLI ET TARAVO

Sévérité des infestations du bombyx disparate
au 19-06-2025

Évolution de la surface infestée
depuis le 13-06-2025: 16.7%

Carte situation du 13-06-2025




Alors que sur la période du 13/06, des progressions en surfaces de + de 40 % étaient observées, les dernières images satellites démontrent un ralentissement de l'expansion autour de 17 % sur la dernière semaine. Des refeuillaisons sont d'ores et déjà observées sur le secteur et la décroissance semble amorcée.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)

ZONE "VENTISERI"
Sévérité des infestations du bombyx disparate
au 19-06-2025

Évolution de la surface infestée
depuis le 13-06-2025: 60.9%

Carte situation du 13-06-2025



Avec un taux de progression de +60 % de surfaces infestées entre le 13/06 et le 19/06, le foyer de Ventiseri, bien que plus restreint en surfaces, est toujours actif.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)

**Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de Corse**

Le Solférino, 8 cours Napoléon - 20704 Ajaccio CEDEX 9

Tel : 04 95 51 86 00

www.draaf.corse.agriculture.gouv.fr



Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt de Corse

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux abonnés de la lettre d'information de la DRAAF un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant.

Vous souhaitez vous abonner à cette lettre électronique : communication.draaf-corse@agriculture.gouv.fr

Vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre : communication.draaf-corse@agriculture.gouv.fr