PRÉFET
DE CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

DRAAF de Corse
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

Bulletin de situation N°3 – Bombyx disparate

3 juillet 2025

Situation :

L'infestation exceptionnelle tant par l'ampleur des surfaces impactées que par les cycles de reproduction plus rapides que dans les épisodes précédents, par la chenille du Bombyx Disparate qui touche la Corse depuis quelques semaines connaît désormais une décroissance.

Les analyses du département de la santé des forêts du ministère en charge de l'Agriculture et de ses correspondants locaux permettent, comme annoncé lors du précédent bulletin, de confirmer que la décroissance est amorcée et que la végétation repart avec de fortes de refeuillaisons sur certains territoires (cf cartographies ci-après).

Si la chenille de Bombyx Disparate s'observe surtout sur les chênes et les châtaigniers, relevons qu'elle est particulièrement polyphage et peut se nourrir d'autres plantes (hêtre, et

certains arbres fruitiers, notamment). Les expertises devront donc porter à la fois sur le volume des surfaces mais potentiellement aussi sur la nature des surfaces touchées.

Évaluation et évolution des surfaces :

La phase de décroissance est amorcée et une refeuillaison des chênes est d'ores et déjà observable, avec un forte reprise de la végétation sur certains endroits..

Ces éléments sont confirmés par les analyses en cours sur les 5 foyers, où nous constatons :

– une forte diminution des surfaces impactées sur les foyers du Cap Corse et du Nord de Bastia, liée à la refeuillaison ;

– une décroissance avancée des surfaces impactées sur les foyers du Centre Corse, dans les vallées du Prunelli et du Taravo et dans le secteur de Ventiseri.

Les surfaces impactées par la chenille du Bombyx Disparate s'étendent sur environ 20 000 hectares.

Vous trouverez joint à ce bulletin, un état de la situation sur les 5 foyers repérés en Corse, et l'évolution en cours entre le 19/06/25 et le 01/07/25 : Cap Corse, Nord de Bastia, Centre Corse, vallées du Prunelli et du Taravo, et Ventiseri.



Depuis, les dernières analyses des images satellites remontant au 19/06, on note une décroissance importante de la surface infestée d'environ – 75 %, au 01/07. La refeuillaison est déjà avancée.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)



Depuis, les dernières analyses des images satellites remontant au 19/06, on note une décroissance marquée de la surface infestée d'environ – 45 %, au 01/07. La refeuillaison est déjà amorcée.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)



Alors que sur la précédente période au 19/06, des progressions en surfaces de + 21 % étaient observées, les dernières images satellites démontrent un ralentissement de l'expansion autour de 15 % sur la dernière semaine. Des refeuillaisons sont d'ores et déjà observées sur le secteur et la décroissance semble amorcée.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)

ZONE VALLÉES DU PRUNELLI ET TARAVO

Sévérité des infestations du bombyx disparate au 01-07-2025



Évolution de la surface infestée depuis le 19-06-2025: 23%

Carte situation du 19-06-2025



Alors que sur la précédente période au 19/06, des progressions en surfaces de + de 17 % étaient observées, les dernières images satellites démontrent une expansion toujours en cours mais ralentie autour de 23 % sur la dernière semaine. Des refeuillaisons sont d'ores et déjà observées sur le secteur et la décroissance semble amorcée.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)



Avec un taux de progression de +60 % de surfaces infestées entre le 13/06 et le 19/06, le foyer de Ventiseri, bien que toujours actif, semble avoir amorcé la décroissance avec une évolution des surfaces infestées de + 13 % seulement.

(Ndlr : en vert, indice de végétation plus favorable en 2025 rapport à la situation de référence prise en mai 2023, en l'absence d'infestation par le Bombyx Disparate. En rouge foncé, indice de végétation très dégradé lié à l'infestation par le Bombyx Disparate, par rapport à la situation de référence prise en mai 2023.)

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse
Le Solférino, 8 cours Napoléon - 20704 Ajaccio CEDEX 9
Tel : 04 95 51 86 00
www.draaf.corse.agriculture.gouv.fr

PRÉFET DE CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt de Corse

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux abonnés de la lettre d'information de la DRAAF un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant.
Vous souhaitez vous abonner à cette lettre électronique : communication.draaf-corse@agriculture.gouv.fr
Vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre : communication.draaf-corse@agriculture.gouv.fr